



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 658 551 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94119130.6**

(51) Int. Cl.⁶: **C07D 273/00, C07K 11/02,
A61K 31/395**

(22) Anmeldetag: **05.12.94**

(30) Priorität: **16.12.93 DE 4342907**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.06.95 Patentblatt 95/25

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL SE

(71) Anmelder: **BAYER AG**

D-51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder: **Jeschke, Dr. Peter**
Heymannstrasse 38
D-51373 Leverkusen (DE)
Erfinder: **Scherkenbeck, Dr. Jürgen**
Bechhausen 73
D-42929 Wermelskirchen (DE)
Erfinder: **Bonse, Dr. Gerhard**

Gerstekamp 1

D-51061 Köln (DE)

Erfinder: **Bischoff, Dr. Erwin**

Pahlkestrasse 73

D-42115 Wuppertal (DE)

Erfinder: **Mencke, Dr. Norbert**

Grundermühle 2

D-51381 Leverkusen (DE)

Erfinder: **Harder, Dr. Dr. Achim**

Europaring 54

D-51109 Köln (DE)

Erfinder: **Londershausen, Dr. Michael**

Gallileistrasse 11

D-40699 Erkrath (DE)


Erfinder: **Müller, Dr. Hartwig**

Wiesenweg 10

D-42553 Velbert (DE)

(54) **Neue cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen und Ihre Verwendung zur Bekämpfung von Endoparasiten.**

(57) **Neue cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen der allgemeinen Formel (I)**



(I)

EP 0 658 551 A1

in welcher

R für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht

EP 0 658 551 A1

sowie deren optische Isomere und Racemate.
und ihre Verwendung zur Bekämpfung von Endoparasiten auf dem Gebiet der Medizin und Veterinärmedizin.


Die vorliegende Erfindung betrifft neue cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Bekämpfung von Endoparasiten.

Bestimmte cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen (Enniatine) und Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Endoparasitizide sind Gegenstand einer vorgängigen, jedoch nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung (Deutsche Patentanmeldung DE-OS 4 317 458.2).

Die Wirksamkeit dieser vorbekannten Verbindungen ist jedoch bei niedrigen Aufwandmengen und Konzentrationen nicht völlig zufriedenstellend.

Die vorliegende Erfindung betrifft:

1. Neue cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen der allgemeinen Formel (I)




in welcher

R für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht

sowie deren optische Isomere und Racemate.

2. Verfahren zur Herstellung der neuen cyclischen Depsipeptide mit 18 Ringatomen der allgemeinen Formel (I)




in welcher

R für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht

sowie deren optische Isomere und Racemate,

dadurch gekennzeichnet, daß man

offenkettige Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel (II)




in welcher

10 einer der Reste R¹, R² und R³ für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht und die anderen beiden Reste für Methyl und sec.-Butyl stehen, in Gegenwart eines geeigneten Kupplungsreagenzes, in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels und in Gegenwart eines Verdünnungsmittels cyclisiert.

15 Die neuen cyclischen Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel (I) sowie deren optische Isomere und Racemate sowie deren Säureadditions-Salze und Metallsalz-Komplexe eignen sich hervorragend zur Bekämpfung von Endoparasiten, besonders auf dem Gebiet der Medizin und Veterinärmedizin.

Die Herstellung der offenkettigen Hexadepsipeptide der Formel (II) ist in einer vorgängigen, jedoch nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung beschrieben (vgl. Deutsche Patentanmeldung P 4 317 458.2)


Man erhält die Verbindungen der allgemeinen Formel (II)



in welcher

30 R¹, R² und R³ die weiter oben angegebene Bedeutung besitzen, wenn man beispielsweise

a) Tetradepsipeptide der allgemeinen Formel (III)




40 in welcher

A für Wasserstoff oder Benzyl steht, oder für eine Gruppe der Formel - CO-R⁴ steht, worin

45 R⁴ für geradkettiges, verzweigtes Alkoxy oder Arylalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht,

R¹ und R² die oben angegebene Bedeutung haben,


in einem ersten Reaktionsschritt mit Didepsipeptiden der allgemeinen Formel (VII)




55 in welcher

R³ die weiter oben angegebene Bedeutung besitzt,


in Gegenwart geeigneter Kupplungsreagenzien, in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels und in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt oder
b) Tetradepsipeptide der allgemeinen Formel (IV)




in welcher
R² und R³ die weiter oben angegebene Bedeutung besitzen,
in einem ersten Reaktionsschritt mit Didepsipeptiden der allgemeinen Formel (V)




in welcher
A und R¹ die weiter oben angegebene Bedeutung besitzen,
in Gegenwart geeigneter Kupplungsreagenzien, in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels und in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt,
dann in einem zweiten Reaktionsschritt die aus den Verfahren a) oder b) resultierenden offenkettigen Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel



in welcher
A R¹, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben,
in Gegenwart eines Verdünnungsmittels und gegebenenfalls in Gegenwart einer Protonensäure C-terminal verseift oder in Gegenwart eines Verdünnungsmittels und gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Katalysators N-terminal deblockiert,
dann in einem dritten Reaktionsschritt die resultierenden offenkettigen Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel



oder



in welcher

- 10 A R¹, R² und R³ die oben angegebene Bedeutung besitzen,
in Gegenwart eines Verdünnungsmittels und gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Katalysators
N-terminal deblockiert oder in Gegenwart eines Verdünnungsmittels und in Gegenwart einer Protonen-
säure erneut C-terminal verseift.

- 15 Die erfindungsgemäßen cyclischen Depsipeptide mit 18 Ringatomen sind durch die Formel (I) allge-
mein definiert.

Bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I),
in welcher

- R für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes C₁₋₈-Alkyl, insbesondere Methyl, Ethyl, Propyl,
Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, sec.-Pentyl, 1,2-Dimethyl-propyl, neo-
20 Pentyl, 1-Ethyl-propyl, 1,1-Dimethylpropyl, Hexyl, Isohexyl, sec.-Hexyl, Heptyl, Isoheptyl, sec.-
Heptyl, tert.-Heptyl, Oktyl, Isooktyl, sec.-Oktyl, C₃₋₇-Cycloalkyl, insbesondere Cyclopentyl, Cyclo-
hexyl, Cycloheptyl, C₃₋₇-Cycloalkyl-C₁₋₄-alkyl, insbesondere Cyclopentylmethyl, Cyclohexylme-
thyl oder Cycloheptylmethyl steht.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können 6 bis 8 Chiralitätszentren aufweisen.

- 25 Die optisch aktiven Verbindungen der allgemeinen Formel (I) besitzen mindestens eine festgelegte
Konfiguration an einem der 6 bis 8 möglichen Chiralitätszentren, wobei an den restlichen Chiralitätszentren
keine festgelegte Konfiguration vorliegen kann.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
in welcher

- 30 R für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl oder sec.-Butyl steht,
Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
in welcher

R für Methyl, Ethyl oder sec.-Butyl steht, und deren stereoisomere Verbindungen die nachfolgende
Bedeutung haben,

- 35 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
40 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
45 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-2-amino-butyryl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-2-amino-butyryl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-2-amino-butyryl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-2-amino-butyryl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-2-amino-butyryl-D-lactyl-),
50 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-2-amino-butyryl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-2-amino-butyryl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-2-amino-butyryl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-2-amino-butyryl-L-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-2-aminobutyryl-L-lactyl-),
55 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-),
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-),

- Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-),
 5 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-),
 10 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-).

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können in optisch aktiven, stereoisomeren Formen oder als racemische Gemische vorliegen. Bevorzugt sind jedoch optisch aktive, stereoisomere Formen der Verbindungen der allgemeinen Formel (I).

- Im einzelnen seien folgende stereoisomeren Formen der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) genannt:


- 15 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-),
 20 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-glycyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-glycyl-L-lactyl-),
 25 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-glycyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 30 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 35 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 40 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 45 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
 50 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 55 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),
 Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-),

2

[illegible]


Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-)
Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-).

Setzt man beispielsweise nach Verfahren 2 zur Herstellung der neuen cyclischen Hexadepsipeptide der Formel (I) als Verbindungen der Formel (II) N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure ein, so läßt sich das Verfahren durch folgendes Reaktionsschema wiedergeben:



Die zur Durchführung des Verfahrens als Ausgangsstoffe benötigten offenkettigen Hexadepsipeptide sind durch die Formel (II) allgemein definiert. In dieser Formel stehen R¹ bis R³ vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) als bevorzugt für diese Substituenten genannt wurden.

Die als Ausgangsmaterialien verwendeten offenkettigen Hexadepsipeptide der Formel (II) sind in einer vorgängigen, jedoch nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung beschrieben (vgl. Deutsche Patentanmeldung P 4 317 458.2).



Im einzelnen seien folgende stereoisomeren Verbindungen der allgemeinen Formel (II) genannt:

N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-milchsäure,
N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-milchsäure,
N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure,
N-Methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-glycyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure,
N-Methyl-glycyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-milchsäure,
N-Methyl-glycyl-D-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-milchsäure,

100

- N-Methyl-L-leucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-L-leucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-D-leucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-leucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-milchsäure,
 5 N-Methyl-D-leucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-D-leucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-leucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 10 N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alloisoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 15 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-milchsäure,
 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-isoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-milchsäure,
 20 N-Methyl-D-alanyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-lactyl-N-methyl-D-alloisoleucyl-L-milchsäure.

Die Cyclisierung der Verbindungen der Formel (II) wird vorzugsweise in Gegenwart geeigneter Kupplungsreagenzien und in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels in einem Verdünnungsmittel unter Hochverdünnungsbedingungen durchgeführt.

- Als Kupplungsreagenzien zur Durchführung des Verfahrens 2 finden alle, die zur Herstellung einer
 25 Amidbindung geeignet sind (vgl. z.B.: Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band 15/2; Bodanszky et al., Peptide Synthesis 2nd ed. (Wiley & Sons, New York 1976) oder Gross, Meienhofer, The Peptides: Analysis synthesis, biology (Academic Press, New York 1979), Verwendung. Vorzugsweise werden folgende Methoden herangezogen: Aktivestermethode mit Pentachlor- (Pcp) und Pentafluorphenol (Pfp), N-Hydroxysuccinimid, N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarboxamid (HONB), 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) oder 3-Hydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin als Alkoholkomponente, Kupplung mit Carbodiimiden wie Dicyclohexyl-carbodiimid (DCC) nach dem DCC-Additiv-Verfahren, oder mit n-Propanphosphonsäureanhydrid (PPA) und Gemischt-Anhydrid-Methode mit Pivaloylchlorid, Ethyl- (EEDQ) und Isobutylchlorformiat (IIDQ) oder Kupplung mit Phosphoniumreagenzien, wie Benzotriazol-1-yl-oxy-tris-
 30 (dimethylamino-phosphonium)-hexafluorophosphat (BOP), Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl), oder mit Phosphonsäureesterreagenzien, wie Cyanphosphonsäurediethylester (DEPC) und Diphenylphosphorylazid (DPPA) oder Uroniumreagenzien, wie 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetra-methyluronium-tetrafluoroborat (TBTU).

- Bevorzugt ist die Kupplung mit Phosphoniumreagenzien wie Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl), Benzotriazol-1-yl-oxy-tris(dimethylaminophosphonium)-hexafluorophosphat (BOP) und
 40 Phosphonsäureesterreagenzien, wie Cyanphosphonsäurediethylester (DEPC) oder Diphenylphosphorylazid (DPPA).

Als basische Reaktionshilfsmittel können alle geeigneten Säurebindemittel eingesetzt werden wie Amine, insbesondere tertiäre Amine sowie Alkali- und Erdalkaliverbindungen.

- Beispielhaft seien dafür erwähnt die Hydroxide, Oxide und Carbonate des Lithiums, Natriums, Kaliums,
 45 Magnesiums, Calciums und Bariums, ferner weitere basische Verbindungen wie Triethylamin, Trimethylamin, Tribenzylamin, Triisopropylamin, Tributylamin, Tribenzylamin, Tricyclohexylamin, Triamylamin, Trihexylamin, N,N-Dimethyl-anilin, N,N-Di-methyl-toluidin, N,N-Dimethyl-p-aminopyridin, N-Methyl-pyrrolidin, N-Methyl-piperidin, N-Methyl-imidazol, N-Methyl-pyrrol, N-Methyl-morpholin, N-Methyl-hexamethylenimin, Pyridin, 4-Pyrrolidino-pyridin, 4-Dimethylamino-pyridin, Chinolin, α -Picolin, β -Picolin, Isochinolin, Pyrimidin,
 50 Acridin, N,N,N',N'-Tetramethylen-diamin, N,N',N'-Tetra-ethylendiamin, Chinoxalin, N-Propyl-diisopropylamin, N-Ethyl-diisopropylamin, N,N'-Dimethyl-cyclohexylamin, 2,6-Lutidin, 2,4-Lutidin, Triethylendiamin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU).

Vorzugsweise finden tertiären Amine, insbesondere Trialkylamine wie Triethylamin, N,N-Diisopropylethylamin oder N-Methylmorpholin, Verwendung.

- Als Verdünnungsmittel zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 2 kommen alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage.

Als Beispiele sind zu nennen: Halogenkohlenwasserstoffe, insbesondere Chlorkohlenwasserstoffe, wie Tetrachlorethylen, Tetrachlorethan, Dichlorpropan, Methylenchlorid, Dichlorbutan, Chloroform, Tetrachlorkoh-

lenstoff, Trichlorethan, Trichlorethylen, Pentachlorethan, Difluorbenzol, 1,2-Dichlorethan, Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Chlortoluol, Trichlorbenzol; Alkohole wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, Butanol; Ether wie Ethylpropylether, Methyl-tert.-butylether, n-Butylether, Di-n-butylether, Di-isobutylether, Diisoamylether, Diisopropylether, Anisol, Phenetol, Cyclohexylmethylether, Diethylether, Ethylenglycoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Dichlordiethylether; Nitrokohlenwasserstoffe wie Nitromethan, Nitroethan, Nitrobenzol, Chlornitrobenzol, o-Nitrotoluol; Nitrile wie Acetonitril, Butyronitril, Isobutyronitril, Benzonitril, m-Chlorbenzonitril; aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe wie Heptan, Hexan, Nonan, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedepunktsintervalles von 70 °C bis 190 °C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Petrolether, Ligroin, Octan, Benzol, Toluol, Xylol; Ester wie Ethylacetat, Isobutylacetat; Amide z.B. Formamid, N-Methylformamid, N,N-Dimethylformamid, N-Methyl-pyrrolidon; Ketone wie Aceton, Methylglykoxon. Auch Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel kommen in Betracht.

Bevorzugt sind Halogenkohlenwasserstoffe, insbesondere Chlorkohlenwasserstoffe, wie Methylenchlorid und Chloroform oder Ether, wie beispielsweise Dioxan, und Gemische aus Alkoholen und Ether.

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Hexadepsipeptide können nach klassischen Verfahren hergestellt werden, beispielsweise demjenigen, wie es von H.-G. Lerchen und H. Kunz (Tetrahedron Lett. 26 (43) (1985) S. 5257-5260; 28 (17) (1987) S. 1873-1876) unter Ausnutzung der Veresterungsmethode nach B. F. Gisin (Helv. Chim. Acta 56 (1973) S. 1476) beschrieben ist.

Das Verfahren wird durchgeführt, indem Verbindungen der Formel (II) in Gegenwart eines der angegebenen Kupplungsreagenzien und in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels in einem Verdünnungsmittel unter Hochverdünnungsbedingungen zusammengegeben und gerührt werden. Die Reaktionsdauer beträgt 4 bis 72 Stunden. Die Umsetzung erfolgt bei Temperaturen zwischen -5 °C und +100 °C, bevorzugt zwischen -5 °C und +50 °C, besonders bevorzugt bei 0 °C bis Raumtemperatur. Es wird unter Normaldruck gearbeitet.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 2 setzt man pro Mol an N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure der Formel (II) im allgemeinen 1,0 bis 3,0 Mol, vorzugsweise 1,0 bis 1,5 Mol Kupplungsreagenz, ein.

Nach vollendeter Umsetzung wird die Reaktionslösung schwach alkalisch gewaschen, die organische Phase abgetrennt, getrocknet und im Vakuum eingedunstet. Die anfallenden Produkte lassen sich in üblicher Weise durch Umkristallisieren oder Säulenchromatographie reinigen (vgl. auch die Herstellungsbeispiele).

Mit dem Verfahren 2 sind aus offenkettigen Hexadepsipeptiden mit sowohl L- als auch D-Konfiguration aufgebaute Depsipeptidsequenzen, Cyclohexadepsipeptide unter Beibehaltung der ursprünglichen Konfiguration der Ausgangsstoffe erhältlich.

Alternativ lassen sich auch die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) nach dem von U. Schmidt et al. für makrocyclische Peptidalkaloide angewendeten Verfahren (vgl. z.B.: U. Schmidt et al. in Synthesis (1991) S. 294-300 [Didemnins A, B und C]; Angew. Chem. 96 (1984) S. 723-724 [Dolastatin 3]; Angew. Chem. 102 (1990) S. 562-563 [Fenestatin A]; Angew. Chem. 97 (1985) S. 606-607 [Ulicyclamid]; J. Org. Chem. 47 (1982) S. 3261-3264) darstellen.


Die als Ausgangsmaterialien verwendeten N-Methyl-aminosäuren und 2-Halogencarbonsäurederivate sind teilweise bekannt (vgl. z.B.: N-Methyl-aminosäuren: R. Bowmann et al. J. Chem. Soc. (1950) S. 1346; J. R. McDermott et al. Can. J. Chem. 51 (1973) S. 1915;

H. Wurziger et al., Kontakte (Merck-Darmstadt) 3 (1987) S. 8; 2-Halogencarbonsäurederivate: S. M. Birnbaum et al. J. Amer. Chem. Soc. 76 (1954) S. 6054, C. S. Rondestvedt, Jr. et al. Org. Reactions 11 (1960) S. 189 [Review]) bzw. können nach den dort beschriebenen Verfahren erhalten werden.


Für die Kupplungsreaktion zur Darstellung der als Ausgangsverbindungen eingesetzten Depsipeptide (III), (IV), (V), (VI) und (VII) finden alle Kupplungsreagenzien, die zur Herstellung einer Amidbindung geeignet sind (vgl. z.B.: Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band 15/2; Bodanszky et al., Peptide Synthesis 2nd ed. (Wiley & Sons, New York 1976) oder Gross, Meienhofer, The Peptides: Analysis synthesis, biology (Academic Press, New York 1979), Verwendung.

Die offenkettigen Hexadepsipeptide (II) können beispielsweise für das [L-D-L-D-L-D]-Isomer nach einer Reaktionssequenz erhalten werden, die die nachfolgenden Stufen umfaßt:


a) Synthese der [L-D]-konfigurierten Didepsipeptide der Formeln (V) bis (VII):



(V)





(VI)



(VII)

worin A eine N-terminale Schutzgruppe, wie z.B. die Benzyl oder Benzyloxycarbonylgruppe und B eine C-terminale Schutzgruppe, wie z.B. die tert-Butoxygruppe, darstellt.


Dies entspricht beispielsweise für Formel (VIIa),
worin B für tert.-Butyloxy steht, dem folgenden Reaktionsschema:



(VIIa)

Die Herstellung der enantiomerenreinen Verbindungen der Formeln (V), (VI) und (VII) kann gegebenenfalls auch über die Trennung der Diastereomere nach üblichen Methoden wie beispielsweise Kristallisation, durch Säulenchromatographie oder durch Craig-Verteilung erfolgen. Welches das optimale Verfahren ist, muß von Fall zu Fall entschieden werden, manchmal ist es auch zweckmäßig, Kombinationen der einzelnen Verfahren zu benutzen.

Am Ende dieser Stufe kann entweder eine Entfernung der N-terminalen Schutzgruppe aus den Derivaten der Formel (VIIa) in an sich bekannter Weise durchgeführt werden, beispielsweise durch katalytische Hydrierung, zur Herstellung der Derivate der Formel (VIIc) oder es kann in an sich bekannter Weise eine Abspaltung der C-terminalen Schutzgruppe aus den Derivaten der Formel (V) und (VI), vorzugsweise durch Acidolyse, zur Darstellung der Derivate (Vb) und (VIb) erfolgen:





(Vb)



(VIb)

(VIIc)


b) Synthese der [L-D-L-D]-konfigurierten Tetradepsipeptide der Formel (III) und (IV)




dies entspricht beispielsweise für Formel (IVa),
worin B für tert.-Butyloxy steht, dem nachfolgenden Reaktionsschema:




Man kann anschließend eine Entfernung der N-terminalen Schutzgruppe aus den Derivaten der Formel (IVa) durchführen, beispielsweise durch katalytische Hydrierung wie oben angegeben, zur Herstellung der Derivate der Formel




c) Synthese der offenkettigen [L-D-L-D-L-D]-konfigurierten Hexadepsipeptide der Formel




nach der folgenden Reaktionsgleichung:




25 Man kann anschließend eine Entfernung der C-terminalen Schutzgruppe aus den Derivaten der Formel (IIa) in an sich bekannter Weise, beispielsweise durch Acidolyse, zur Herstellung der Derivate



40 durchführen oder man deblockiert die Derivate der Formel (IIa) N-terminal in an sich bekannter Weise, beispielsweise durch katalytische Hydrierung wie oben angegeben, zur Herstellung der Derivate der Formel



55 Am Ende dieser Stufen kann eine Entfernung der N-terminalen bzw. C-terminalen Schutzgruppe aus den Derivaten der Formel (IIb) bzw. (IIC) in an sich bekannter Weise durchgeführt werden, beispielsweise durch katalytische Hydrierung oder durch Acidolyse wie oben angegeben, zur Herstellung der Derivate der Formel



(II).

Die anfallenden Produkte lassen sich in üblicher Weise durch Umkristallisieren, oder durch Säulenchromatographie reinigen (vgl. auch die Herstellungsbeispiele).

Die Wirkstoffe eignen sich bei günstiger Warmblüttoxizität zur Bekämpfung von pathogenen Endoparasiten, die bei Menschen und in der Tierhaltung und Tierzucht bei Nutz-, Zucht-, Zoo-, Labor-, Versuchs- und Hobbytieren vorkommen. Sie sind dabei gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien der Schädlinge sowie gegen resistente und normal sensible Arten wirksam. Durch die Bekämpfung der pathogenen Endoparasiten sollen Krankheit, Todesfälle und Leistungsminderungen (z.B. bei der Produktion von Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig usw.) vermindert werden, so daß durch den Einsatz der Wirkstoffe eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung möglich ist. Zu den pathogenen Endoparasiten zählen Cestoden, Trematoden, Nematoden, Acantocephalen, insbesondere:

Aus der Ordnung der Pseudophyllidea z.B.: Diphylobothrium spp., Spirometra spp., Schistocephalus spp., Ligula spp., Bothridium spp., Diplogonoporus spp..

Aus der Ordnung der Cyclophyllidea z.B.: Mesocostoides spp., Anoplocephala spp., Paranoplocephala spp., Moniezia spp., Thysanosoma spp., Thysaniezia spp., Avitellina spp., Stilesia spp., Cittotaenia spp., Andrya spp., Bertiella spp., Taenia spp., Echinococcus spp., Hydatigera spp., Davainea spp., Raillietina spp., Hymenolepis spp., Echinolepis spp., Echinocotyle spp., Diorchis spp., Dipylidium spp., Joyeuxiella spp., Diplopylidium spp..

Aus der Unterklasse der Monogenea z.B.: Gyrodactylus spp., Dactylogyrus spp., Polystoma spp..

Aus der Unterklasse der Digenea z.B.: Diplostomum spp., Posthodiplostomum spp., Schistosoma spp., Trichobilharzia spp., Ornithobilharzia spp., Austrobilharzia spp., Gigantobilharzia spp., Leucochloridium spp., Brachylaima spp., Echinostoma spp., Echinoparyphium spp., Echinochasmus spp., Hypoderaeum spp., Fasciola spp., Fasciolides spp., Fasciolopsis spp., Cyclocoelum spp., Typhlocoelum spp., Paramphistomum spp., Calicophoron spp., Cotylophoron spp., Gigantocotyle spp., Fischoederius spp., Gastrothylacus spp., Notocotylus spp., Catatropis spp., Plagiorchis spp., Prosthogonimus spp., Dicrocoelium spp., Eurytrema spp., Troglotrema spp., Paragonimus spp., Collyriclum spp., Nanophyetus spp., Opisthorchis spp., Clonorchis spp., Metorchis spp., Heterophyes spp., Metagonimus spp..

Aus der Ordnung der Enoplida z.B.: Trichuris spp., Capillaria spp., Trichomosoides spp., Trichinella spp.

Aus der Ordnung der Rhabditiida z.B.: Micronema spp., Strongyloides spp..

Aus der Ordnung der Strongylida z.B.: Strongylus spp., Triodontophorus spp., Oesophagodontus spp., Trichonema spp., Gyaloccephalus spp., Cylinthropharynx spp., Poteriostomum spp., Cyclococercus spp., Cylicostephanus spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., Stephanurus spp., Ancylostoma spp., Uncinaria spp., Bunostomum spp., Globocephalus spp., Syngamus spp., Cyathostoma spp., Metastrongylus spp., Dictyocaulus spp., Muellerius spp., Protostrongylus spp., Neostongylus spp., Cystocaulus spp., Pneumostongylus spp., Spicocaulus spp., Elaphostongylus spp., Parelaphostongylus spp., Crenosoma spp., Paracrenosoma spp., Angiostrongylus spp., Aelurostrongylus spp., Filaroides spp., Paraflaroides spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., Marshallagia spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Hyostongylus spp., Obeliscoides spp., Amidostomum spp., Ollulanus spp..

Aus der Ordnung der Oxyurida z.B.: Oxyuris spp., Enterobius spp., Passalurus spp., Syphacia spp., Aspiculuris spp., Heterakis spp..

Aus der Ordnung der Ascaridia z.B.: Ascaris spp., Toxascaris spp., Toxocara spp., Parascaris spp., Anisakis spp., Ascaridia spp..

Aus der Ordnung der Spirurida z.B.: Gnathostoma spp., Physaloptera spp., Thelazia spp., Gongylonema spp., Habronema spp., Parabronema spp., Draschia spp., Dracunculus spp..

Aus der Ordnung der Filariida z.B.: Stephanofilaria spp., Parafilaria spp., Setaria spp., Loa spp., Dirofilaria spp., Litomosoides spp., Brugia spp., Wuchereria spp., Onchocerca spp..

Aus der Ordnung der Gigantorhynchida z.B.: Filicollis spp., Moniliformis spp., Macracanthorhynchus spp., Prosthonorchis spp..

Zu den Nutz- und Zuchttieren gehören Säugetiere wie z.B. Rinder, Pferde, Schafe, Schweine, Ziegen, Kamele, Wasserbüffel, Esel, Kaninchen, Damwild, Rentiere, Pelztierchen wie z.B. Nerze, Chinchilla, Waschbär, Vögel wie z.B. Hühner, Gänse, Puten, Enten, Süß- und Salzwasserfische wie z.B. Forellen, Karpfen, Aale,

Reptilien, Insekten wie z.B. Honigbiene und Seidenraupe.

Zu Labor- und Versuchstieren gehören Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Goldhamster, Hunde und Katzen.

Zu den Hobbytieren gehören Hunde und Katzen.

- 5 Die Anwendung kann sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch erfolgen.

Die Anwendung der Wirkstoffe erfolgt direkt oder in Form von geeigneten Zubereitungen enteral, parenteral, dermal, nasal, durch Behandlung der Umgebung oder mit Hilfe wirkstoffhaltiger Formkörper wie z.B. Streifen, Platten, Bänder, Halsbänder, Ohrmarken, Gliedmaßenbänder, Markierungsvorrichtungen.

- 10 Die enterale Anwendung der Wirkstoffe geschieht z.B. oral in Form von Pulver, Tabletten, Kapseln, Pasten, Tränken, Granulaten, oral applizierbaren Lösungen, Suspensionen und Emulsionen, Boli, medikiertem Futter oder Trinkwasser. Die dermale Anwendung geschieht z.B. in Form des Tauchens (Dippen), Sprühens (Sprayen) oder Aufgießens (pour-on and spot-on). Die parenterale Anwendung geschieht z.B. in Form der Injektion (intramuskulär, subcutan, intravenös, intraperitoneal) oder durch Implantate.

Geeignete Zubereitungen sind:

- 15 Lösungen wie Injektionslösungen, orale Lösungen, Konzentrate zur oralen Verabreichung nach Verdünnung, Lösungen zum Gebrauch auf der Haut oder in Körperhöhlen, Aufgußformulierungen, Gele; Emulsionen und Suspensionen zur oralen oder dermalen Anwendung sowie zur Injektion; halbfeste Zubereitungen;

- 20 Formulierungen, bei denen der Wirkstoff in einer Salbengrundlage oder in einer Öl in Wasser oder Wasser in Öl Emulsionsgrundlage verarbeitet ist;

Feste Zubereitungen wie Pulver, Premixe oder Konzentrate, Granulate, Pellets, Tabletten, Boli, Kapseln; Aerosole und Inhalate, wirkstoffhaltige Formkörper.

Injektionslösungen werden intravenös, intramuskulär und subcutan verabreicht.

- 25 Injektionslösungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wird und eventuell Zusätze wie Lösungsvermittler, Säuren, Basen, Puffersalze, Antioxidantien, Konservierungsmittel zugefügt werden. Die Lösungen werden steril filtriert und abgefüllt.

Als Lösungsmittel seien genannt: Physiologisch verträgliche Lösungsmittel wie Wasser, Alkohole wie Ethanol, Butanol, Benzylalkohol, Glycerin, Propylenglykol, Polyethylenglykole, N-Methyl-pyrrolidon, sowie Gemische derselben.

- 30 Die Wirkstoffe lassen sich gegebenenfalls auch in physiologisch verträglichen pflanzlichen oder synthetischen Ölen, die zur Injektion geeignet sind, lösen.

Als Lösungsvermittler seien genannt: Lösungsmittel, die die Lösung des Wirkstoffs im Hauptlösungsmittel fördern oder sein Ausfallen verhindern. Beispiele sind Polyvinylpyrrolidon, polyoxyethyliertes Rhizinöl, polyoxyethylierte Sorbitanester.

- 35 Konservierungsmittel sind: Benzylalkohol, Trichlorbutanol, p-Hydroxybenzoesäureester, n-Butanol.

Orale Lösungen werden direkt angewendet. Konzentrate werden nach vorheriger Verdünnung auf die Anwendungskonzentration oral angewendet. Orale Lösungen und Konzentrate werden wie oben bei den Injektionslösungen beschrieben hergestellt, wobei auf steriles Arbeiten verzichtet werden kann.

- 40 Lösungen zum Gebrauch auf der Haut werden aufgeträufelt, aufgestrichen, eingerieben, aufgespritzt oder aufgesprüht. Diese Lösungen werden wie oben bei den Injektionslösungen beschrieben hergestellt.

Es kann vorteilhaft sein, bei der Herstellung Verdickungsmittel zuzufügen. Verdickungsmittel sind: Anorganische Verdickungsmittel wie Bentonite, kolloidale Kieselsäure, Aluminiummonostearat, organische Verdickungsmittel wie Cellulosederivate, Polyvinylalkohole und deren Copolymere, Acrylate und Methacrylate.

- 45 Gele werden auf die Haut aufgetragen oder aufgestrichen oder in Körperhöhlen eingebracht. Gele werden hergestellt, indem Lösungen, die wie bei den Injektionslösungen beschrieben hergestellt worden sind, mit soviel Verdickungsmittel versetzt werden, daß eine klare Masse mit salbenartiger Konsistenz entsteht. Als Verdickungsmittel werden die weiter oben angegebenen Verdickungsmittel eingesetzt.

- 50 Aufgieß-Formulierungen werden auf begrenzte Bereiche der Haut aufgegossen oder aufgespritzt, wobei der Wirkstoff die Haut durchdringt und systemisch wirkt.

Aufgieß-Formulierungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in geeigneten hautverträglichen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen gelöst, suspendiert oder emulgiert wird. Gegebenenfalls werden weitere Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Haftmittel zugefügt.

- 55 Als Lösungsmittel seien genannt: Wasser, Alkanole, Glycole, Polyethylenglycole, Polypropylenglycole, Glycerin, aromatische Alkohole wie Benzylalkohol, Phenylethanol, Phenoxyethanol, Ester wie Essigester, Butylacetat, Benzylbenzoat, Ether wie Alkylenglykolalkylether wie Dipropylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmono-butylether, Ketone wie Aceton, Methylalketon, aromatische und/oder aliphatische Kohlen-

wasserstoffe, pflanzliche oder synthetische Öle, DMF, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, 2,2-Dimethyl-4-oxy-methylen-1,3-dioxolan.

Farbstoffe sind alle zur Anwendung am Tier zugelassenen Farbstoffe, die gelöst oder suspendiert sein können.

5 Resorptionsfördernde Stoffe sind z.B. DMSO, spreitende Öle wie Isopropylmyristat, Dipropylenglykolpelargonat, Silikonöle, Fettsäureester, Triglyceride, Fettalkohole.

Antioxidantien sind Sulfite oder Metabisulfite wie Kaliummetabisulfit, Ascorbinsäure, Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Tocopherol.

Lichtschutzmittel sind z.B. Novantisolsäure.

10 Haftmittel sind z.B. Cellulosederivate, Stärkederivate, Polyacrylate, natürliche Polymere wie Alginate, Gelatine.

Emulsionen können oral, dermal oder als Injektionen angewendet werden.

Emulsionen sind entweder vom Typ Wasser in Öl oder vom Typ Öl in Wasser.

Sie werden hergestellt, indem man den Wirkstoff entweder in der hydrophoben oder in der hydrophilen Phase löst und diese unter Zuhilfenahme geeigneter Emulgatoren und gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, viskositätserhöhende Stoffe, mit dem Lösungsmittel der anderen Phase homogenisiert.

15 Als hydrophobe Phase (Öle) seien genannt: Paraffinöle, Silikonöle, natürliche Pflanzenöle wie Sesamöl, Mandelöl, Rizinusöl, synthetische Triglyceride wie Capryl / Caprinsäure-biglycerid, Triglyceridgemisch mit Pflanzenfettsäuren der Kettenlänge C₈₋₁₂ oder anderen speziell ausgewählten natürlichen Fettsäuren, Partialglyceridgemische gesättigter oder ungesättigter eventuell auch hydroxylgruppenhaltiger Fettsäuren, Mono- und Diglyceride der C₈/C₁₀-Fettsäuren.

20 Fettsäureester wie Ethylstearat, Di-n-butyl- α -adipat, Laurinsäurehexylester, Dipropylenglykolpelargonat, Ester einer verzweigten Fettsäure mittlerer Kettenlänge mit gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C₁₆-C₁₈, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Capryl/Caprinsäureester von gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C₁₂-C₁₈, Isopropylstearat, Ölsäureoleylester, Ölsäuredecylester, Ethyloleat, Milchsäureethylester, wachsartige Fettsäureester wie künstliches Entenbüzeldrüsenfett, Dibutylphthalat, Adipinsäurediisopropylester, letzterem verwandte Estergemische u.a.

Fettalkohole wie Isotridecylalkohol, 2-Octyldodecanol, Cetylstearylalkohol, Oleylalkohol.

30 Fettsäuren wie z.B. Ölsäure und ihre Gemische.

Als hydrophile Phase seien genannt:

Wasser, Alkohole wie z.B. Propylenglycol, Glycerin, Sorbitol und ihre Gemische.

Als Emulgatoren seien genannt: nichtionogene Tenside, z.B. polyoxyethyliertes Rizinusöl, polyoxyethyliertes Sorbitan-monoleat, Sorbitanmonostearat, Glycerinmonostearat, Polyoxyethylstearat, Alkylphenolpolyglykolether;

35 ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl- β -iminodipropionat oder Lecithin;

anionaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykoletherorthophosphorsäureesteronoethanolaminsalz;

40 Als weitere Hilfsstoffe seien genannt: Viskositätserhöhende und die Emulsion stabilisierende Stoffe wie Carboxymethylcellulose, Methylcellulose und andere Cellulose- und Stärke-Derivate, Polyacrylate, Alginate, Gelatine, Gummi-arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Copolymere aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid, Polyethylenglykole, Wachse, kolloidale Kieselsäure oder Gemische der aufgeführten Stoffe.

45 Suspensionen können oral, dermal oder als Injektion angewendet werden. Sie werden hergestellt, indem man den Wirkstoff in einer Trägerflüssigkeit gegebenenfalls unter Zusatz weiterer Hilfsstoffe wie Netzmittel, Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidantien Lichtschutzmittel suspendiert.

Als Trägerflüssigkeiten seien alle homogenen Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische genannt.

Als Netzmittel (Dispergiermittel) seien die weiter oben angegebenen Tenside genannt.

50 Als weitere Hilfsstoffe seien die weiter oben angegebenen genannt.

Halbfeste Zubereitungen können oral oder dermal verabreicht werden. Sie unterscheiden sich von den oben beschriebenen Suspensionen und Emulsionen nur durch ihre höhere Viskosität.

Zur Herstellung fester Zubereitungen wird der Wirkstoff mit geeigneten Trägerstoffen gegebenenfalls unter Zusatz von Hilfsstoffen vermischt und in die gewünschte Form gebracht.

55 Als Trägerstoffe seien genannt alle physiologisch verträglichen festen Inertstoffe. Als solche dienen anorganische und organische Stoffe. Anorganische Stoffe sind z.B. Kochsalz, Carbonate wie Calciumcarbonat, Hydrogencarbonate, Aluminiumoxide, Kieselsäuren, Tonerden, gefälltes oder kolloidales Siliciumdioxid, Phosphate.

Organische Stoffe sind z.B. Zucker, Zellulose, Nahrungs- und Futtermittel wie Milchpulver, Tiermehle, Getreidemehle und -schrote, Stärken.

Hilfsstoffe sind Konservierungsmittel, Antioxidantien, Farbstoffe, die bereits weiter oben aufgeführt worden sind.

- 5 Weitere geeignete Hilfsstoffe sind Schmier- und Gleitmittel wie z.B. Magnesiumstearat, Stearinsäure, Talkum, Bentonite, zerfallsfördernde Substanzen wie Stärke oder quervernetztes Polyvinylpyrrolidon, Bindemittel wie z.B. Stärke, Gelatine oder lineares Polyvinylpyrrolidon sowie Trockenbindemittel wie mikrokristalline Cellulose.

- Die Wirkstoffe können in den Zubereitungen auch in Mischung mit Synergisten oder mit anderen
10 Wirkstoffen, die gegen pathogene Endoparasiten wirken, vorliegen. Solche Wirkstoffe sind z.B. L-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazothiazol, Benzimidazolcarbamate, Praziquantel, Pyrantel, Febantel.

Anwendungsfertige Zubereitungen enthalten den Wirkstoff in Konzentrationen von 10 ppm - 20 Gewichtsprozent, bevorzugt von 0,1 - 10 Gewichtsprozent.

- Zubereitungen, die vor Anwendung verdünnt werden, enthalten den Wirkstoff in Konzentrationen von 0,5
15 - 90 Gew.-%, bevorzugt von 5 - 50 Gew.-%.

Im allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Mengen von etwa 1 bis etwa 100 mg Wirkstoff je kg Körpergewicht pro Tag zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen.

Beispiel A

- 20 In vivo Nematodentest

Trichostrongylus colubriformis / Schaf

- 25 Experimentell mit Trichostrongylus colubriformis infizierte Schafe wurden nach Ablauf der Präpatenzzeit des Parasiten behandelt. Die Wirkstoffe wurden als reiner Wirkstoff oral und/oder intravenös appliziert.

Der Wirkungsgrad wird dadurch bestimmt, daß man die mit dem Kot ausgeschiedenen Wurmeier vor und nach der Behandlung quantitativ auszählt.

- Ein völliges Sistieren der Eiausscheidung nach der Behandlung bedeutet, daß die Würmer abgetrieben
30 wurden oder so geschädigt sind, daß sie keine Eier mehr produzieren (Dosis efectiva).

Geprüfte Wirkstoffe und wirksame Dosierungen (Dosis efectiva) sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

35

Wirkstoff Beispiel Nr.	Dosis efectiva in mg/kg
1	10
2	10
40 5	10

Beispiel B

- 45 In vivo Nematodentest

Haemonchus contortus / Schaf

- 50 Experimentell mit Haemonchus contortus infizierte Schafe wurden nach Ablauf der Präpatenzzeit des Parasiten behandelt. Die Wirkstoffe wurden als reiner Wirkstoff oral und/oder intravenös appliziert.

Der Wirkungsgrad wird dadurch bestimmt, daß man die mit dem Kot ausgeschiedenen Wurmeier vor und nach der Behandlung quantitativ auszählt.

- Ein völliges Sistieren der Eiausscheidung nach der Behandlung bedeutet, daß die Würmer abgetrieben
55 wurden oder so geschädigt sind, daß sie keine Eier mehr produzieren (Dosis efectiva).


Geprüfte Wirkstoffe und wirksame Dosierungen (Dosis efectiva) sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Wirkstoff Beispiel-Nr.	Dosis efectiva in mg/kg
1	10
5	10
10	10
16	10

Herstellungsbeispiele

Beispiel 1:

Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-)




Zu einer Lösung von 0,5 g (0,87 mMol) N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure in 500 ml Methylenchlorid werden bei 0 °C 0,28 g (2,18 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base") sowie 0,27 g (1,05 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl) zugegeben und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird nochmals bei 0 °C mit 0,28 g (2,18 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base") sowie 0,27 g (1,05 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl) versetzt und weitere 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionslösung wird zweimal mit Wasser gewaschen, die organische Phase abgetrennt und nach dem Trocknen über Natriumsulfat im Vakuum eingeeengt. Das zurückbleibende Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule (Kieselgel 60 - Merck, Korngröße : 0,04 bis 0,063 mm) mit dem Fließmittel Toluol: Essigsäureethylester (2:1) chromatographiert. Man erhält 0,29 g (59,8 % der Theorie) Cyclo(-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-).

¹³C-NMR (100 MHz, CDCl₃, δ): 10,6; 10,7; 13,5; 15,4; 15,9; 16,0; 16,8; 17,1 (-CH₃); 24,4; 24,5 (-CH₂-); 30,9; 31,5; (-CH-); 32,8; 33,9; 34,2 (-N-CH₃); 56,2; 59,9; 60,5 (-N-CH-); 66,0; 66,3; 67,7 (-O-CH-); 168,7; 169,7; 170,1 (-CO-N-); 169,0; 170,0; 170,4 (-CO-O-) ppm


El-MS m/z (%): 555 (M⁺, 64); 499 (37); 483 (34); 428 (12); 357 (19); 340 (5); 255 (50); 182 (100); 100 (52)

Analog können die in den nachstehenden Tabellen 1 bis 4 aufgeführten Verbindungen der Formel (I) hergestellt werden.


Tabelle 1**Beispiele für Verbindungen der Formel (I)**

Bsp.- Nr.	Rest R	C-1	Kon C-2	figu C-3	rati C-4	on C-5	an * C-6	C-7	Physikalische Daten ^{a)}
2	-H	L	D	L	D	-	D	L	499 (M ⁺ , 100); 428 (38); 312 (28); 213 (62); 182 (73); 140 (49)
3	-H	L	D	L	D	-	D	D	
4	-H	D	L	D	L	-	L	D	
5	-CH ₃	L	D	L	D	L	D	L	31,8; 33,8; 34,6 (-N-CH ₃); 168,1; 168,7; 169,9 (-CO-N-); 170,0; 170,4; 170,5 (-CO-O-); 513(M ⁺ , 42); 440 (22); 255 (29); 213 (60); 182 (75); 141 (82); 58 (100)
6	-C ₂ H ₅	L	D	L	D	L	D	L	527 (M ⁺ , 100); 472 (27); 454 (42); 255 (36); 182 (92)
7	-n-C ₃ H ₇	L	D	L	D	L	D	L	30,1; 33,9; 34,8 (-N-CH ₃); 168,6; 168,7; 169,9 (-CO-N-); 170,0; 170,3; 170,4 (-CO-O-);
8	-n-C ₃ H ₇	L	D	L	D	L	D	D	541 (M ⁺ , 87); 468 (41); 354 (18); 255 (42); 213 (41); 182 (100); 141 (90)
9	-n-C ₃ H ₇	D	L	D	L	D	L	D	30,9; 31,2; 33,9 (-N-CH ₃); 168,5; 168,6; 169,7 (-CO-N-); 169,9; 170,1; 170,4 (-CO-O-)
10	-i-C ₃ H ₇	L	D	L	D	L	D	L	
11	-i-C ₃ H ₇	L	D	L	D	L	D	D	541 (M ⁺ , 81); 468 (39); 255 (49); 213 (36); 182 (100); 141 (68)
12	-i-C ₃ H ₇	D	L	D	L	D	L	D	29,9; 33,9; 34,9 (-N-CH ₃); 168,4; 168,7; 169,9 (-CO-N-); 170,0; 170,3; 170,5 (-CO-O-);
13	-n-C ₄ H ₉	L	D	L	D	L	D	L	
14	-n-C ₄ H ₉	L	D	L	D	L	D	D	
15	-n-C ₄ H ₉	D	L	D	L	D	L	D	
16	-i-C ₄ H ₉	L	D	L	D	L	D	L	555(M ⁺ , 45); 499 (49); 428 (12); 255 (40); 182 (100); 141 (42)
17	-i-C ₄ H ₉	L	D	L	D	L	D	D	555(M ⁺ , 45); 499 (49); 428 (12); 255 (40); 182 (100); 141 (42)
18	-i-C ₄ H ₉	D	L	D	L	D	L	D	

a) ¹³C-NMR (100 MHz, CDCl₃, δ) [in ppm]; FAB-MS bzw. EI-MS m/z (%)


Tabelle 2**Beispiele für Verbindungen der Formel (Ia, R: -Methyl)**

Bsp.- Nr.	C-1	C-2	Konfigura C-3	tion an * C-4	C-5	C-6	C-7
19	L	D	L	D	L	D	D
20	L	D	D	D	L	D	L
21	D	L	D	D	D	L	L
22	L	D	L	L	L	D	L
23	L	D	D	L	L	D	L
24	D	L	L	L	D	L	L
25	D	L	L	D	D	L	L
26	D	L	D	L	D	L	L
27	D	L	D	L	D	L	D

Tabelle 3**Beispiele für Verbindungen der Formel (Ib, R: -Ethyl)**

(Ib)


Bsp.- Nr.	C-1	C-2	Konfigura C-3	tion an * C-4	C-5	C-6	C-7
28	L	D	L	D	L	D	D
29	L	D	D	D	L	D	L
30	D	L	D	D	D	L	L
31	L	D	L	L	L	D	L
32	L	D	D	L	L	D	L
33	D	L	L	L	D	L	L
34	D	L	L	D	D	L	L
35	D	L	D	L	D	L	L
36	D	L	D	L	D	L	D

Tabelle 4**Beispiele für Verbindungen der Formel (Ic, R: -sec.-Butyl)**

Bsp.- Nr.	C-1	C-2	C-3	Konfigu- ration an C-4	C-5	C-6	C-7	C-8
37	L	D	L	D	L	D	L	D
38	L	D	L	D	L	D	D	D
39	L	D	L	D	L	D	D	L
40	L	D	D	D	L	D	L	L
41	D	L	D	D	L	D	L	L
42	L	D	L	L	L	D	L	L
43	L	D	D	L	L	D	L	L
44	D	L	L	D	L	D	L	L
45	D	L	L	D	D	L	L	L
46	D	L	D	L	D	L	L	L
47	D	L	D	L	D	L	D	D
48	D	L	D	L	D	L	L	D
49	D	L	D	L	D	L	D	L

Ausgangsstoffe der Formel (II)**Beispiel (II-1)**

N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester




Zu einer Lösung von 5,0 g (16,2 mMol) N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure und 7,6 g (16,2 mMol) N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester in 200 ml Methylenchlorid werden bei 0 °C 4,6 g (35,6 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base") sowie 4,5 g (17,8 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl) zugegeben und 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionslösung wird zweimal mit Wasser gewaschen, die organische Phase abgetrennt und nach dem Trocknen über Natriumsulfat im Vakuum eingeengt. Das zurückbleibende Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule (Kieselgel 60 - Merck, Korngröße : 0,04 bis 0,063 mm) mit dem Fließmittel Toluol: Essigsäureethylester (3:1) chromatographiert. Man erhält 7,4 g (59,9 % der Theorie) N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester.

El-MS m/z (%): 763 (M⁺, 10); 707 (M⁺-CH₂ = CMe₂, 12); 690 (M⁺-OCMe₃, 7); 651 (9); 491 (19); 419 (34); 386 (24); 292 (25); 183 (41); 148 (42); 91 (Ph-CH₂, 100)

Beispiel (II-2)

N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester




Die Kupplungsreaktion erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-1) unter Verwendung von: 14,0 g (52,9 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure, 25,0 g (52,9 mMol) N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, 500 ml Methylenchlorid, 15,0 g (116,3 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base"), 14,8 g (58,2 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl).

Das zurückbleibende Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule (Kieselgel 60 - Merck, Korngröße: 0,04 bis 0,063 mm) mit dem Fließmittel Cyclohexan : Essigsäureethylester (1:1) chromatographiert. Man erhält 22,0 g (57,8 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester.

El-MS m/z (%): 719 (M⁺, 45); 646 (50); 600 (80); 544 (82); 148 (100)

Beispiel (II-3)

N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure




In eine auf 0 °C gekühlte Lösung von 6,2 g (8,12 mMol) N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester in 220 ml absolutem Methylenchlorid wird 20 Minuten trockenes Chlorwasserstoffgas eingeleitet. Anschließend rührt man ca. 16 Stunden bei Raumtemperatur und engt den gesamten Reaktionsansatz im Vakuum ein. Man erhält 4,9 g

(85,3 % der Theorie) N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure, die ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

MS m/z (%): 708 ($M^+ + H$, 1); 707 (M^+ , 6); 651 (3); 572 (1); 436 (3); 292 (3); 192 (8); 148 (30); 91 (Ph-CH₂, 100)

Beispiel (II-4)

N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure



Die C-terminale Acidolyse erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-3) unter Verwendung von:


21,8 g (30,3 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, 500 ml Methylenchlorid.

Man erhält 20,0 g (99,5 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure, die ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

FAB-MS m/z (%): 665 ($M^+ + H$, 37); 664 (M^+ , 100); 148 (82)

Beispiel (II-5)

N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure



4,5 g (6,36 mMol) N-Benzoyloxycarbonyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure werden in 180 ml Ethanol in Gegenwart von 0,45 g Pd(OH)₂/Kohle [20 % Pd-Gehalt] bis zur Beendigung der Wasserstoffaufnahme hydriert (ca. 4 Stunden). Nach Abfiltrieren des Katalysators wird die gesamte Reaktionslösung im Vakuum eingeeengt.

Man erhält 3,6 g (98,7 % der Theorie) N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure, die ohne weitere Reinigung cyclisiert werden kann.

EI-MS m/z (%): 573 (M^+ , 2); 472 (14), 386 (34); 285 (17); 183 (82); 155 (27); 100 (60); 58 (MeNH-CHMe, 100)


Die Darstellung von:

Beispiel I (II-6)

N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure

5

10



und


15

Beispiel (II-7)

N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure

20

25




30 erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5)
Analog können die in der nachstehenden Tabelle 5 aufgeführten Ausgangsstoffe der allgemeinen Formel (II)
als [L-D-L-D-L-D]-Stereoisomere hergestellt werden:

35

Tabelle 5

Beispiele für Ausgangsstoffe der allgemeinen Formel (II)

40



45


50

55

Bsp.- Nr.	A	R ¹	R ²	R ³	B	Physikalische Daten ^{a)}
II-8	-Z	-H	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	707 (M ⁺ , 7); 650 (M ⁺ -CMe ₃ ; 15); 435 (15); 91 (100)
II-9	-Z	-H	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	652 (M ⁺ +H, 24); 608 (3); 363 (24); 91 (100)
II-10	-H	-H	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	517 (M ⁺ , 4); 461 (2); 141 (100)
II-11	-Bn	-CH ₃	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	677 (M ⁺ , 2); 620 (M ⁺ -OCMe ₃ , 5); 558 (2); 502 (2); 190 (100)
II-12	-Bn	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	
II-13	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	
II-14	-Bn	-CH ₃	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	621 (M ⁺ , 2); 564 (2), 502 (3); 335 (5); 190 (100)
II-15	-Bn	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-OH	
II-16	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-CH ₃	-OH	
II-17	-H	-CH ₃	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	531 (M ⁺ , 6); 487 (12), 474 (42); 388 (80)
II-18	-H	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-OH	
II-19	-H	-s-C ₄ H ₉	-CH ₃	-CH ₃	-OH	
II-20	-Z	-C ₂ H ₅	-CH ₃	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	735 (M ⁺ , 13); 679 (M ⁺ -H ₇ C=CMe ₇)
II-21	-Z	-C ₂ H ₅	-CH ₃	-CH ₃	-OH	679 (M ⁺ , 10); 91 (100)
II-22	-H	-C ₂ H ₅	-CH ₃	-CH ₃	-OH	546 (M ⁺ +H, 10); 512 (14)
II-23	-Bn	-n-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	705 (M ⁺ , 2); 632 (M ⁺ -OCMe ₃ , 2); 586 (3); 530 (3); 176 (100)
II-24	-Bn	-n-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	
II-25	-H	-n-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	559 (M ⁺ , 1); 86 (100)
II-26	-Bn	-i-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	705 (M ⁺ , 2); 632 (M ⁺ -OCMe ₃ , 3); 586 (5); 530 (7); 176 (100)
II-27	-Bn	-i-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	
II-28	-H	-i-C ₃ H ₇	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	649 (M ⁺ , 2); 606 (4); 530 (8); 176 (100)
II-29	-Z	-i-C ₄ H ₉	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	539 (M ⁺ , 0,5); 516 (5)
II-30	-Z	-i-C ₄ H ₉	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	763 (M ⁺ , 2); 190 (48); 91 (100)
II-31	-H	-i-C ₄ H ₉	-CH ₃	-s-C ₄ H ₉	-OH	707 (M ⁺ , 1); 651 (2); 419 (5); 91 (100)

^{a)} FAB-MS bzw. EI-MS m/z (%); Z: -CO-O-CH₂-Phenyl; Bn: -CH₂-Phenyl

Ausgangsstoffe der Form I (III)


Beispiel (III-1)5 **N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure -tert.-butylester**

15

Die Kupplungsreaktion erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-1) unter Verwendung von:
 20,4 g (66,6 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 18,2 g (66,6 mMol) N-Methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 500 ml Methylenchlorid,
 18,9 g (146,4 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base"),
 18,6 g (73,2 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl).

Man erhält 37,0 g (98,8 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester der ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

25 EI-MS m/z (%): 563 ($M^+ + H$, 1); 562 (M^+ , 3); 505 ($M^+ - CMe_3$, 7); 489 ($M^+ - OCMe_3$, 6); 190 (100)

Beispiel (III-2)30 **N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure -tert.-butylester**

40 Die Kupplungsreaktion erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-1) unter Verwendung von:
 13,6 g (51,3 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure,
 14,0 g (51,3 mMol) N-Methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 300 ml Methylenchlorid,


14,6 g (112,7 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base"),
 14,4 g (56,4 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl).

Man erhält 26,7 g (100 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester der ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.


50 EI-MS m/z (%): 520 (M^+ , 46); 447 ($M^+ - OCMe_3$, 77); 345 (42); 148 (100)

55


55

Beispi I (III-3)**N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

- Die Kupplungsreaktion erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-1) unter Verwendung von:
- 5,0 g (16,3 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure,
 - 3,7 g (16,3 mMol) N-Methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 - 150 ml Methylenchlorid,
 - 4,6 g (35,7 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base"),
 - 4,6 g (17,9 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl).
- Das zurückbleibende Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule (Kieselgel 60 - Merck, Korngröße: 0,04 bis 0,063 mm) mit dem Fließmittel Cyclohexan : Essigsäureethylester (6:1) chromatographiert. Man erhält 5,1 g (60,4 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester.
- EI-MS m/z (%): 520 (M^+ , 58); 463 ($M^+ - CMe_3$, 76); 447 ($M^+ - OCM_3$, 91); 190 (100)

Beispiel (III-4)**N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

- Die Kupplungsreaktion erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-1) unter Verwendung von:
- 24,8 g (93,3 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure,
 - 21,4 g (93,3 mMol) N-Methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 - 500 ml Methylenchlorid,
 - 26,5 g (205,1 mMol) N,N-Diisopropylethylamin ("Hünig's Base"),
 - 26,1 g (102,6 mMol) Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphoniumsäurechlorid (BOP-Cl).
- Das zurückbleibende Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule (Kieselgel 60 - Merck, Korngröße : 0,04 bis 0,063 mm) mit dem Fließmittel Cyclohexan: Essigsäureethylester (2:1) chromatographiert. Man erhält 16,5 g (36,9 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester.
- EI-MS m/z (%): 478 (M^+ , 1); 405 ($M^+ - OCM_3$, 6); 148 (100)


Beispiel (III-5)**N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

Die C-terminale Acidolyse erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-3) unter Verwendung von:

9,0 g (15,9 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, 300 ml Methylenchlorid.

Man erhält 8,2 g (100 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure, die ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

El-MS m/z (%): 506 (M^+ , 2); 449 (8); 190 (100)


Ausgangsstoffe der Formel (IV)**Beispiel (IV-1)****N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

Die N-terminale Deblockierung erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5) innerhalb von ca. 4 Stunden unter Verwendung von:


35,0 g (62,2 mMol) N-Benzylloxycarbonyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, 3,5 g $Pd(OH)_2$ /Kohle [20 % Pd-Gehalt], 700 ml Ethanol

Man erhält 25,1 g (85,4 % der Theorie) N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne weitere Reinigung für die Kupplungsreaktion verwendet werden kann.


El-MS m/z (%): 472 (M^+ , 6); 359 (6); 273 (6); 100 (100)

Beispiel (IV-2)**N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

Die N-terminale Deblockierung erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5) innerhalb von ca. 4 Stunden unter Verwendung von:
 26,3 g (50,5 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 3,0 g Pd(OH)₂/Kohle [20 % Pd-Gehalt],
 500 ml Ethanol
 Man erhält 21,3 g (98,0 % der Theorie) N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne weitere Reinigung für die Kupplungsreaktion verwendet werden kann.

Beispiel (IV-3)**N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

Die N-terminale Deblockierung erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5) innerhalb von ca. 4 Stunden unter Verwendung von:
 4,8 g (9,3 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
 0,5 g Pd(OH)₂/Kohle [20 % Pd-Gehalt],
 100 ml Ethanol
 Man erhält 3,2 g (83,2 % der Theorie) N-Methyl-L-isoleucyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne weitere Reinigung für die Kupplungsreaktion verwendet werden kann.
 FAB-MS m/z (%): 431 (M⁺ + H, 12); 190 (100)

Beispiel (IV-4)**N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester**

Die N-terminale Deblockierung erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5) innerhalb von ca. 4 Stunden unter Verwendung von:

15,0 g (32,0 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
1,5 g Pd(OH)₂/Kohle [20 % Pd-Gehalt],
400 ml Ethanol


Man erhält 10,8 g (89,5 % der Theorie) N-Methyl-L-alanyl-D-lactyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne weitere Reinigung für die Kupplungsreaktion verwendet werden kann.

FAB-MS m/z (%): 388 (M⁺, 0,5); 344 (M⁺-CO₂, 4); 315 (15); 58 (100)

Ausgangsstoffe der Formel (V), (Vi) und (Vii)

10 **Beispiel (V-1)**

N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester



7,0 g (36,2 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-alanin werden in 155 ml Methanol und 15 ml Wasser gelöst, mit 30 ml einer 20 %igen Cäsiumcarbonat-Lösung versetzt und ca. eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird dreimal mit ca. 100 ml absolutem Dimethylformamid versetzt, im Vakuum eingengt und im Hochvakuum getrocknet. Das Cäsiumsalz wird in 76 ml Dimethylformamid vorgelegt, mit 6,0 g (36,2 mMol) L-2-Chlor-milchsäure-tert.-butylester versetzt und ca. 18 Stunden bei Raumtemperatur gerührt.

Die gesamte Reaktionlösung wird im Vakuum eingengt, der ölige Rückstand in Methylenchlorid aufgenommen und zweimal mit Wasser geschüttelt. Danach wird die organische Phase abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingengt.


Man erhält 8,9 g (76,5 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-alanyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃, δ): 1,37; 1,49 (2d, 6H, 2 x -CH₃; J = 7,1 Hz); 1,47 (s, 9H, -OCMe₃); 2,34 (s, 3H, -N-CH₃); 3,51 (q, 1H, -O-CH-; J = 7,1 Hz); 3,74 (dd, 2H, Ph-CH₂-); 4,97 (q, 1H, -N-CH-; J = 7,1 Hz); 7,23 - 7,37 (m, 5H, arom.-H) ppm

El-MS m/z (%): 321 (M⁺, 1); 248 (2); 148 (Ph-CH₂-NMe-CHMe, 100); 91 (Ph-CH₂, 63)

Beispiel (VI-1)

N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure



Die C-terminale Acidolyse erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-3) unter Verwendung von:


25,0 g (68,8 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
500 ml Methylenchlorid.

Man erhält 21,0 g (99,3 % der Theorie) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure, die ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

El-MS m/z (%): 307 (M⁺, 3); 250 (28); 190 (PhCH₂-NMe-CH-CHMeCH₂Me, 100); 91 (PhCH₂, 85)

Beispi I (VII-1)

5 N-Methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester



15 Die N-terminale Deblockierung erfolgt analog der Reaktionsvorschrift des Beispiels (II-5) unter Verwendung von:

25,0 g (68,8 mMol) N-Benzyl-N-methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester,
500 ml Ethanol,

20 2,5 g Pd(OH)₂/Kohle [20 % Pd-Gehalt]


Man erhält 18,2 g (96,8 % der Theorie) N-Methyl-L-isoleucyl-D-milchsäure-tert.-butylester, der ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt werden kann.

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃, δ): 1,47 (s, 9H, 3 x CH₃); 2,40 (s, 3H, -N-CH₃) ppm.

25 Analog können die in den nachstehenden Tabellen 6 bis 8 aufgeführten Verbindungen der Formeln (V) - (VII) hergestellt werden.

Tabelle 6


Beispiele für Ausgangsstoffe der allgemeinen Formel (V)



Bsp.-Nr.	A	Rest R ¹	B	Konfigur C-1	ation an * C-2	Physikalische Daten ^{a)}
V-2	-Z	-H	-O-t-C ₄ H ₉	-	D	295 (22) ^{b)}
V-3	-Z	-H	-O-t-C ₄ H ₉	-	L	
V-4	-Z	-H	-OH	-	D	
V-5	-Z	-H	-OH	-	L	295 (M ⁺ , 10)
V-6	-Z	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	309 (16) ^{b)}
V-7	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	321 (M ⁺ , 1)
V-8	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
V-9	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	
V-10	-Z	-CH ₃	-OH	L	D	309 (M ⁺ , 6)
V-11	-Bn	-CH ₃	-OH	L	D	265 (M ⁺ , 2)
V-12	-Bn	-CH ₃	-OH	L	L	
V-13	-Bn	-CH ₃	-OH	D	D	
V-14	-Bn	-CH ₃	-OH	D	L	
V-15	-Z	-C ₂ H ₅	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	379 (M ⁺ , 0,5)
V-16	-Z	-C ₂ H ₅	-OH	L	D	323 (M ⁺ , 11)
V-17	-Bn	-i-C ₃ H ₇	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	250 (M ⁺ , 7)
V-18	-Bn	-i-C ₃ H ₇	-OH	L	D	293 (M ⁺ , 4)
V-19	-Bn	-n-C ₃ H ₇	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	1,49 (-CMe ₃); 2,32 (-NMe)
V-20	-Bn	-n-C ₃ H ₇	-OH	L	D	239 (M ⁺ , 1)
V-21	-Bn	-i-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	363 (M ⁺ , 1)
V-22	-Bn	-i-C ₄ H ₉	-OH	L	D	307 (M ⁺ , 7)
V-23	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	1,49 (-CMe ₃); 2,26 (-NMe)
V-24	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	
V-25	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
V-26	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	
V-27	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	L	D	307 (M ⁺ , 3)
V-28	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	L	L	
V-29	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	D	D	
V-30	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	D	L	

a) FAB- bzw. EI-MS m/z (%) bzw. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃, δ) in ppm; jeweils Singulett


b) M⁺ - CH₂=CMe₂: Z: -CO-O-CH₂-Phenyl; Bn: -CH₂-Phenyl

Tabelle 7**Beispiele für Verbindungen der allgemeinen Formel (VI)**

Bsp.- Nr.	A	Rest R ²	B	Konfigur C-3	ation an * C-4	Physikalische Daten a)
VI-2	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	321 (M ⁺ , 1)
VI-3	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	
VI-4	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
VI-5	-Bn	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	
VI-6	-Bn	-CH ₃	-OH	L	D	265 (M ⁺ , 2)
VI-7	-Bn	-CH ₃	-OH	L	L	
VI-8	-Bn	-CH ₃	-OH	D	D	
VI-9	-Bn	-CH ₃	-OH	D	L	
VI-10	-Z	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	407 (M ⁺ , 7)
VI-11	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	1,49 (-CMe ₃); 2,26 (-NMe)
VI-12	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	
VI-13	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
VI-14	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	
VI-15	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	L	L	307 (M ⁺ , 3)
VI-16	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	D	D	
VI-17	-Bn	-s-C ₄ H ₉	-OH	D	L	

a) FAB- bzw. EI-MS m/z (%) bzw. ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃, δ) in ppm; jeweils Singulets


Z: -CO-O-CH₂-Phenyl; Bn: -CH₂-Phenyl

Tabelle 8**Beispiele für Verbindungen der allgemeinen Formel (VII)**

Bsp.- Nr.	A	Rest R ³	B	Konfigur C-5	ation an * C-6	Physikalische Daten ^{a)}
VII-2	-H	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	D	1,47 (-CMe ₃); 2,44 (-NMe)
VII-3	-H	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	
VII-4	-H	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
VII-5	-H	-CH ₃	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	
VII-6	-H	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	L	L	1,47 (-CMe ₃); 2,40 (-NMe)
VII-7	-H	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	D	
VII-8	-H	-s-C ₄ H ₉	-O-t-C ₄ H ₉	D	L	

a) ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃, δ) in ppm; jeweils Singulets**Patentansprüche**


1. Cyclische Depsipeptide mit 18 Ringatomen der allgemeinen Formel (I)



in welcher


R für Wasserstoff geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht sowie deren optische Isomere und Racemate.

2. Verfahren zur Herstellung der cyclischen Depsipeptide mit 18 Ringatomen der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1



in welcher

R¹ für Wasserstoff geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoff-
 atomen steht
 sowie deren optische Isomere und Racemate,
 dadurch gekennzeichnet, daß man
 offenkettige Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel (II)



in welcher

einer der Reste R¹, R² und R³ für Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit
 bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht und die anderen beiden Reste für Methyl und sec.-Butyl stehen, in
 Gegenwart eines geeigneten Kupplungsreagenzes, in Gegenwart eines basischen Reaktionshilfsmittels
 und in Gegenwart eines Verdünnungsmittels cyclisiert.

3. Verwendung der cyclischen Hexadepsipeptide der allgemeinen Formel (I) gemäß Anspruch 1, sowie
 deren optische Isomere und Racemate sowie deren Säureadditions-Salze und Metallsalz-Komplexe zur
 Bekämpfung von Endoparasiten auf dem Gebiet der Medizin und Veterinärmedizin.
4. Endoparasitizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem cyclischen Hexadep-
 sipeptid der Formel (I) gemäß Anspruch 1.
5. Verfahren zur Herstellung von endoparasitiziden Mitteln, dadurch gekennzeichnet, daß man cyclische
 Hexadepsipeptide der Formel (I) gemäß Anspruch 1 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven
 Mitteln vermischt.
6. Verwendung von cyclischen Hexadepsipeptiden der Formel (I) gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von
 endoparasitiziden Mitteln.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 11 9130

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY., Bd.70, Nr.5, Mai 1992, OTTAWA CA Seiten 1281 - 1287 L. A. BLAIS ET AL 'Isolation and characterization of enniatins from fusarium avenaceum DAOM 196490' * Seite 1282 *	1	C07D273/00 C07K11/02 A61K31/395
Y	--- CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 83, no. 13, 29. September 1975, Columbus, Ohio, US; abstract no. 114872e, V. Z. PLETNEV ET AL 'Theoretical conformational analysis of cyclic hexadepsipeptides with LLLLLL and LOLLDL residue configurations' Seite 606 ; * Zusammenfassung * & BIOORG. KHIM., Bd.1, Nr.2, 1975 Seiten 160 - 165	1	
D,P, X	--- WO-A-93 25543 (BAYER) * Ansprüche 1,17 * -----	1,6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C07D C07K A61K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20. Februar 1995	Prüfer Voyiazoglou, D
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	